











月日	/		/	
経過	入院当日～手術前日		手術当日(手術前)	
達成目標	入院生活に適応できるよう、環境を整えます。		手術への不安が軽減できるようにします。	
治療・薬剤 (点滴・内服) 処置	 <ul style="list-style-type: none"> 持参薬を確認させていただきます。 全身麻酔手術の方は、麻酔科の受診があります。 必要に応じて診察があります。 		 <p>病棟を出る時間 (:)</p> <p>手術時間 (: ~)</p> <p>()麻酔で行います。</p>	
検査	必要に応じて採血などがあります。 			
活動・安静度 リハビリ	病院内の歩行ができます。 		翌朝までベッドの上での安静です。	
食事	常食 	絶食 	流動食 	
清潔	入浴することができます		入浴できません	
排泄	トイレ		ベッド上での排泄となります。	
患者様及び ご家族への 説明 栄養指導 服薬指導	<ul style="list-style-type: none"> 主治医より手術についての説明があります。 病棟のオリエンテーションを行い、問診表に沿ってお話を聞かせて頂きます。不明な点や気になることは何でも尋ねてください。 手洗い、うがいをし、感染予防をしましょう。 手術部位(耳周囲)の髪の毛を剃ります。その際は、理髪店にて髪を剃って頂きます。(1000円程かかります) 栄養状況に基づき、栄養士が栄養管理の指導をさせていただきます。 薬剤管理の指導をいたします。 全身麻酔による手術のため食事と水分の制限があります。 <p>* 食事 月 日 時まで</p> <p>* 水分 月 日 時まで</p>		<ul style="list-style-type: none"> アルジネードウォーター飲水 有(月 日 時)・無 内服薬 有()・無 手術室へ行く30分前に手術着に着替えます。また、肺血栓塞栓症予防のため弾力靴下を履きます。手術室へ行く前にお手洗いを済ませて下さい。 T字帯、スプーン、前開きのパジャマ、タオル、ティッシュを用意して下さい。金属類、コンタクトレンズ、義歯など外せるものは全て外して化粧はしないで下さい。男性は髭剃りをして頂く場合があります。 手術中、家族は病棟で待機になります。貴重品は家族に預けて下さい。 手術後、手術棟の家族説明室にて説明がある際は看護師が案内します。 	
	<ul style="list-style-type: none"> 手術した方の耳を下にして寝ないように注意して下さい。 痛みがある場合は我慢せずに、申し出て下さい。 ガーゼを固定しているテープが外れてくる場合は申し出て下さい。 吐き気、息苦しさを感じた際にはすぐにナースコールを押してください。 手術用の弾力靴下は歩行が安定するまで着用します。手術後の足先の曲げ伸ばしを心がけましょう。 便秘の時は、水分をしっかりととり、それでも排便のない場合は、無理に力まず申し出て下さい。 手洗い、うがいをし感染予防をしましょう。 			

※これはあくまで予定であり、状況によりましては変更することがありますのでご了承下さい。

@PATIENTNAME 様の入院診療計画書

月日	/		/		/	
経過	手術後1日目～手術後6日目		手術後7日目(抜糸)～退院まで		退院日	
達成目標	痛みなどの苦痛が増強しないようにします。				創部の状態が安定し、退院後の生活が理解できるように努めます。	
治療・薬剤 (点滴・内服) 処置					退院後の療養上の問題点と治療計画	
	<ul style="list-style-type: none"> 朝夕に抗生剤の点滴があります。手術後3日目から抗生剤は内服になります。 主治医の診察とガーゼ交換があります。 		<ul style="list-style-type: none"> 主治医の診察があります。 術後7日頃に耳の中のガーゼ除去と抜糸があります。 		次回の受診日 月 日 ()	
検査	必要に応じて採血などがあります。				(:) 外来	
活動・安静度 リハビリ	病棟内のみでの歩行となります。手術2日目から病院内の歩行ができます。		病院内の歩行ができます。ふらつきがあるときは安静にしましょう。		・予約時間10分前にはお越し下さい。	
食事	全粥食～常食 		必要に応じて、パンやお粥に変更できます。			
清潔	体拭き(温かいタオルをお渡しします。)		ガーゼ除去と抜糸後、入浴できます。		・鼻をかむことで耳の中にも力がかかるため鼻かみは控えて下さい。	
排泄	トイレ				・高熱が続く、食事がとれない、息苦しいなどの症状があれば病院に連絡し対応の確認を行ってください。	
患者様及びご家族への説明 栄養指導 服薬指導	<ul style="list-style-type: none"> 手術した方の耳を下にして寝ないように注意して下さい。 痛みがある場合は我慢せずに、申し出て下さい。 ガーゼを固定しているテープが外れてくる場合は申し出て下さい。 吐き気、息苦しさを感じた際にはすぐにナースコールを押してください。 手術用の弾力靴下は歩行が安定するまで着用します。手術後の足先の曲げ伸ばしを心がけましょう。 便秘の時は、水分をしっかりととり、それでも排便のない場合は、無理に力まず申し出て下さい。 手洗い、うがいをし感染予防をしましょう。 医療売店でイヤーパーティ(耳栓)を購入して頂きます。 入浴時はイヤーパーティを使用して耳の中に水が入らないようにして下さい。 				<ul style="list-style-type: none"> 退院後の激しい運動や飛行機や登山など気圧の変化のあることは次回受診日までは控え、受診の際に医師に確認を行ってください。 手洗い、うがいをし感染予防をしましょう。 過度な飲酒や喫煙は控えましょう。 大阪医科大学附属病院 072-683-1221	
診断名:			入院期間:	説明日: 年 月 日		
主治医:	㊟		看護師長:	担当看護師:		
担当医:			その他のメディカルスタッフ:			

説明を受けた患者様もしくはご家族様のサイン:

(続柄:)