







# FOLFOX・FOLFIRINOX・FOLFOXIRI療法を受ける @PATIENTNAME 様の入院診療計画書

年月日	入院経過	投与日	投与2日目～3日目	投与4日目～退院前日	退院日
	入院日	投与日	投与2日目～3日目	投与4日目～退院前日	退院日
達成目標	治療について理解でき、精神的に安定した状態で治療に望むことができる	治療を安全・安心に受けることができる。排便コントロールができる	感染予防の必要性を理解し、感染予防行動を取ることができる		退院後の日常生活の注意点を理解することができる
注射		午前中から点滴を開始します。3日間点滴を行います。(点滴の内容についてはお薬説明書を参照して下さい。) 	5FUを点滴します。 		退院後の予定 ・次回受診日 化学療法センター 月 日 曜日 時 分 医師 ※受診前に採血があります 予約時間1時間半前までに採血を終わらせて下さい。 次回入院日: 月 日 曜日
内服	薬剤師が持参薬の確認と指導を行います。 				退院後の療養上の留意点
検査・処置 リハビリ	投与日までに採血があります	・必要に応じて血液検査を行います			お薬は忘れずに用法用量を守って内服して下さい 発熱・下痢・咳・息苦しさ等の症状があれば、無理をせず早めにご連絡下さい。 平日外来診察があるとき 8:30～16:50 化学療法センターへ 夜間・休日のとき時間外外来へ
食事 安静度 清潔	常食 院内歩行 入浴可	常食 いつもより多めに水分摂取するよう心掛けて下さい。急に冷たいものを摂取すると、喉がしめつけられるような感じがすることがあります。 院内歩行 入浴可	常食 院内歩行 入浴可 	いつもより多めに水分を摂取して下さい 	
注意事項	・看護師より入院生活について説明します ・薬剤師から薬の説明をします	・点滴の落ち方が悪くなったり、点滴の入っている所に腫れや痛み・違和感を感じたらすぐにスタッフに知らせて下さい ・便秘や下痢など体調の変化がありましたらすぐにお知らせ下さい。 ・副作用には以下のものもあります。 (吐き気や吐くといった症状 食欲の低下や体のだるさ オキサリプラチン投与後すぐ～数日間末梢神経症状が続きます。 イリノテカンによる腹痛、下痢、発汗など そのような症状が出現があれば、早めにお知らせ下さい。 ・環境の変化や治療の経過により転倒のリスクが高まります。注意して下さい。)			072-683-1221(代) 土13.5 8:30～12:40 消化器内科の対応になります。 

この入院計画は現時点で予想されるものであり、症状に応じて変更になる場合があります

大阪医科大学附属病院 消化器内科

説明日 / /

看護師長 \_\_\_\_\_ その他医療従事者 \_\_\_\_\_

説明を受けた患者様もしくはご家族様のサイン

主治医 \_\_\_\_\_ 印

担当看護師 \_\_\_\_\_ 薬剤師: \_\_\_\_\_ 栄養士: \_\_\_\_\_